

EPITA 2008 - mathématiques 1

(durée de l'épreuve : 3 heures)

Dans tout le problème, on désigne par \mathbb{K} un corps (qu'on pourra supposer égal à \mathbb{R} ou à \mathbb{C}) et par p un entier naturel supérieur ou égal à 2. On convient de plus que :

- ◇ Les vecteurs de l'espace vectoriel \mathbb{K}^p sont des p -uplets x d'éléments de \mathbb{K} qu'on identifie ici à la matrice-colonne de leurs composantes dans la base canonique (e_1, \dots, e_p) définie par :

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, e_p = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On notera ${}^t e_1, \dots, {}^t e_p$ les p matrices-lignes transposées des matrices-colonnes précédentes.

- ◇ L'espace vectoriel $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ des matrices carrées à coefficients dans le corps \mathbb{K} est rapporté à sa base canonique $(E_{ij} / 1 \leq i, j \leq p)$, E_{ij} désignant la matrice de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ dont les éléments sont nuls à l'exception de celui situé à l'intersection de la ligne i et de la colonne j , qui vaut 1. Dans ce contexte, une matrice M de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ s'écrit donc :

$$M = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p m_{ij} E_{ij} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & \cdots & m_{1p} \\ m_{21} & m_{22} & \cdots & m_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ m_{p1} & m_{p2} & \cdots & m_{pp} \end{pmatrix}.$$

Un résultat préliminaire

- a) On considère quatre entiers i, h, k, j compris entre 1 et p .

Vérifier que $E_{ik} E_{kj} = E_{ij}$ et que $E_{ih} E_{kj} = 0$ si $h \neq k$.

- b) Etant donné une matrice $A = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p a_{ij} E_{ij}$ et des entiers x et y compris entre 1 et p , expliciter les produits $E_{xy} A$ et $A E_{xy}$.

- c) *Application* : on désigne par $C_p(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices A de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ telles que :

$$\forall M \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K}), \quad AM = MA.$$

Déduire des résultats précédents l'égalité $C_p(\mathbb{K}) = \{ \lambda I_p / \lambda \in \mathbb{K} \}$.

■ Partie I

On considère dans cette partie une matrice A de l'espace $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ et on étudie l'application d_A associant à toute matrice M de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ la matrice $d_A(M)$ de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ définie par :

$$d_A(M) = AM - MA.$$

1°) *Propriétés générales de d_A*

a) Montrer que d_A est un endomorphisme de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.

b) L'endomorphisme d_A est-il injectif? surjectif? Dans quel cas est-il nul?

c) Montrer que l'endomorphisme d_A vérifie la propriété suivante :

$$\forall M, N \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K}), \quad d_A(MN) = d_A(M)N + M d_A(N).$$

2°) *Etude de d_A lorsque A est diagonalisable*

On suppose dans cette question la matrice A diagonalisable.

a) Montrer que la matrice tA transposée de A est aussi diagonalisable.

b) Montrer que A et tA ont même polynôme caractéristique, donc mêmes valeurs propres.

On désigne alors par $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres distinctes ou non de A et tA et par :

- $\mathcal{V} = (V_1, \dots, V_p)$ une base de vecteurs propres de A associée à $\lambda_1, \dots, \lambda_p$.

- $\mathcal{W} = (W_1, \dots, W_p)$ une base de vecteurs propres de tA associée à $\lambda_1, \dots, \lambda_p$.

c) Calculer $d_A(V_i {}^tW_j)$ en fonction de $V_i {}^tW_j$ pour $1 \leq i, j \leq p$.

On note P et Q les matrices de passage de la base (e_1, \dots, e_p) à ces bases \mathcal{V} et \mathcal{W} , et on considère l'application φ définie de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ dans lui-même par $\varphi(M) = PM {}^tQ$.

d) Préciser les produits Pe_i et Qe_j pour $1 \leq i, j \leq p$.

Comparer les matrices E_{ij} et $e_i {}^te_j$, et en déduire $\varphi(E_{ij})$.

e) Montrer que l'application φ réalise un automorphisme de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.

En déduire que la famille $(V_i {}^tW_j \mid 1 \leq i, j \leq p)$ est une base de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.

f) En déduire que d_A est diagonalisable, et préciser ses valeurs et vecteurs propres.

■ Partie II

On appelle *dérivation* dans une algèbre \mathcal{A} tout endomorphisme d de \mathcal{A} vérifiant de plus :

$$\forall M, N \in \mathcal{A}, \quad d(MN) = d(M)N + M d(N).$$

La dérivation usuelle des polynômes est donc une dérivation au sens précédent dans $\mathbb{K}[X]$.

L'application d_A de la partie I est une dérivation de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ puisqu'on a établi en I.1° que :

$$\forall M, N \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K}), \quad d_A(MN) = d_A(M)N + M d_A(N).$$

On se propose de déterminer dans cette partie II toutes les dérivations d de l'algèbre $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.

1°) *Trace d'une matrice carrée*

On rappelle que la trace d'une matrice carrée $M = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p m_{ij} E_{ij}$ de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ est la somme de ses éléments diagonaux, définie par $\text{Tr}(M) = \sum_{i=1}^p m_{ii}$.

a) Etablir que l'application $M \rightarrow \text{Tr}(M)$ est linéaire de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ dans \mathbb{K} .

b) Etablir, si A, B sont deux matrices de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, l'égalité $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$.

c) En déduire, si P est une matrice inversible de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, l'égalité $\text{Tr}(P^{-1}AP) = \text{Tr}(A)$.

Ainsi, deux matrices semblables ont la même trace.

2°) Trace d'une matrice de projection

Soit une matrice de projection M de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, autrement dit une matrice M telle que $M^2 = M$.
On identifie M à l'endomorphisme canoniquement associé $x \in \mathbb{K}^p \rightarrow Mx \in \mathbb{K}^p$ dans \mathbb{K}^p .

- a) Montrer que les seules valeurs propres possibles de M sont 0 et 1.
b) En exploitant l'égalité $x = Mx + (x - Mx)$ valable pour tout vecteur x de \mathbb{K}^p , établir que :

$$\mathbb{K}^p = \text{Ker}(M - I_p) \oplus \text{Ker}(M).$$

- c) En déduire que M est diagonalisable et qu'il existe une matrice inversible P telle que :

$$P^{-1} M P = D$$

où D est diagonale avec r éléments diagonaux égaux à 1, les autres égaux à 0 ($0 \leq r \leq p$).

- d) Vérifier que cet entier r est la valeur commune de la trace et du rang de D , et donc de M .

Ainsi, pour une matrice de projection M , le rang de M est égal à la trace de M .

Dans la suite du problème, on désigne désormais par d une dérivation de l'algèbre $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, et on lui associe l'application suivante F , définie de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ dans $\mathcal{M}_{2p}(\mathbb{K})$ par :

$$\forall M \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K}), \quad F(M) = \left(\begin{array}{c|c} M & d(M) \\ \hline O_p & M \end{array} \right).$$

($F(M)$ est définie à l'aide des 4 blocs d'ordre p ci-dessus où O_p est la matrice nulle d'ordre p).

3°) Propriétés de l'image par F de la base canonique de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$

- a) Déterminer $d(I_p)$, où I_p désigne la matrice-identité d'ordre p .
b) Etablir que F est un morphisme de l'algèbre $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ dans l'algèbre $\mathcal{M}_{2p}(\mathbb{K})$, c'est à dire qu'on a pour tout élément λ de \mathbb{K} et tout couple (M, N) de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$:

$$F(M + N) = F(M) + F(N), \quad F(\lambda M) = \lambda F(M), \quad F(MN) = F(M)F(N), \quad F(I_p) = I_{2p}.$$

On rappelle que les matrices E_{ij} , où $1 \leq i, j \leq p$, ont été définies au début de ce problème, et qu'on a établi les relations suivantes : $E_{ik} E_{kj} = E_{ij}$ et que $E_{ih} E_{kj} = 0$ si $h \neq k$.

On rappelle également l'inégalité $\text{rg}(AB) \leq \min(\text{rg}(A), \text{rg}(B))$ pour $A, B \in \mathcal{M}_{2p}(\mathbb{K})$.

- c) Etablir, pour $1 \leq i, j \leq p$, la relation $F(E_{ii}) = F(E_{ij})F(E_{jj})F(E_{ji})$.

En déduire que $\text{rg}(F(E_{ii})) \leq \text{rg}(F(E_{jj}))$, puis que $\text{rg}(F(E_{ii})) = \text{rg}(F(E_{jj}))$.

- d) Etablir, pour $1 \leq i \leq p$, que les p matrices $F(E_{ii})$ sont des matrices de projection.

- e) Etablir que $F(E_{11}) + F(E_{22}) + \dots + F(E_{pp}) = I_{2p}$.

En déduire, à l'aide du résultat obtenu en II.2°, la valeur commune du rang et de la trace de ces p matrices de projection $F(E_{ii})$ pour $1 \leq i \leq p$.

4°) Une base adaptée de l'espace vectoriel \mathbb{K}^{2p}

- a) Justifier l'existence de deux vecteurs u, v de \mathbb{K}^{2p} formant une base de l'image de $F(E_{11})$ (l'image de la matrice $F(E_{11})$ s'identifiant à l'image de l'endomorphisme associé de \mathbb{K}^{2p}).

Etablir que $F(E_{11})u = u$ et $F(E_{11})v = v$.

- b) Calculer les produits $F(E_{1k})F(E_{j1})u$ et $F(E_{1k})F(E_{j1})v$ selon les valeurs de j et k .

En déduire que la famille des $2p$ vecteurs suivants forme une base de \mathbb{K}^{2p} :

$$\mathcal{B} = (F(E_{11})u, F(E_{21})u, \dots, F(E_{n1})u, F(E_{11})v, F(E_{21})v, \dots, F(E_{n1})v).$$

- c) Etant donnée une matrice $M = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p m_{ij} E_{ij}$ de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, exprimer dans la base \mathcal{B} :
- le produit $F(M) F(E_{k1}) u$ pour $1 \leq k \leq p$.
 - le produit $F(M) F(E_{k1}) v$ pour $1 \leq k \leq p$.
- d) En déduire, si P désigne la matrice de passage de la base canonique de \mathbb{K}^{2p} à la base \mathcal{B} :

$$\forall M \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K}), \quad P^{-1} F(M) P = \left(\begin{array}{c|c} M & O_p \\ \hline O_p & M \end{array} \right).$$

5°) *Conclusion*

On conserve les notations précédentes et on note, avec des blocs A, B, C, D d'ordre p :

$$P = \left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array} \right).$$

- a) Déduire de la question II.4.d) les égalités suivantes pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$:

$$M C = C M ; \quad M D = D M ; \quad d(M) C = A M - M A ; \quad d(M) D = B M - M B.$$

- b) Déduire de la question préliminaire qu'il existe des scalaires γ et δ tels que :

$$C = \gamma I_p ; \quad D = \delta I_p.$$

- c) Montrer que si γ et δ sont tous les deux nuls, alors la matrice P n'est pas inversible.

En déduire qu'il existe une matrice $X \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ telle qu'on ait :

$$\forall M \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K}), \quad d(M) = X M - M X.$$

Ainsi, les seules dérivations de l'algèbre $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ sont celles étudiées à la partie I.
